

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

30M - 26 AVRIL 1989

GRANDES CULTURES SEMENCES - 2

CEREALES

- Stade épiaison en vue, préservez votre potentiel de rendement
- Localement, risque élevé de montée de la fusariose sur épi
- risque faible des maladies du feuillage, sauf camargue
- Pucerons, bien présents, mais attendre leurs prédateurs

LUZERNE

- rappel phytonomes

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel: 67.92.41.42



Stades : "Gonflement", début épiaison sont les stades moyens les plus représentatifs, les cultures de la zone du delta et de bordure cotière étant le plus souvent à l'épiaison.

Situations :

* Maladies du pied : essentiellement la fusariose, fréquemment observable sur gaines, rarement au dessus du 2ème noeud, mais ayant pu dans certaines rares situations (sol séchant, faible vigueur des talles) passer sur tiges.

* Maladies du feuillage :

- oïdium : fréquemment bien installés en toutes zones et souvent observable jusqu'à la 3ème feuille avec tiges bien "encroutées" d'un épais feutrage blanchâtre parsemé de fructifications noires.

- rouille brune et septoriose, très essentiellement présentes, sur variétés sensibles, en Camargue où le début de la colonisation de la F3 est visible.

PRECONISATIONS :

* **TRAITEZ** sur observation des tous premiers symptômes sur F3 (la 3ème feuille à partir du haut de la tige) pour assurer la protection des étages foliaires supérieurs.

- **UTILISEZ** un produit répondant le mieux à votre situation (voir dépliant "protection des céréales", du précédent bulletin).

- Pour un objectif de rendement élevé (supérieur à 40-45 qx) les spécialités polyvalentes "haut de gamme" sont préférables tout en sachant que leur efficacité sur fusariose, quand elle existe, demeure médiocre à moyenne.

- quelques situations non traitées ou traitées précocement se trouvent avec des populations de phytonomes largement supérieures au seuil de nuisibilité de 100 individus en 5x5 coups de Filet Fauchoir.

- Traitez pour assurer un bon état végétatif avant floraison

lindane	à 400-600 g/ha	Nombreuses spécialités
ULTRACIDE 20	1,5 l/ha	
FASTAC	0,3 l/ha	
KARATE	0,15 l/ha	

ADDITIF DERNIER BULLETIN :

Suite à un problème de gestion informatique, certains abonnés n'ont pas du recevoir le dernier bulletin en date du 11 avril. Veuillez nous le signaler, il vous sera expédié. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce contretemps.